



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano  
Atención: "Pulpitis Reversible"

Código: PA-GU-7-PT-41

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 1 de 4

<b>1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:</b>	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario
<b>2. RESPONSABLE(S):</b>	Profesional Universitario - Odontólogos
<b>3. OBJETIVO:</b>	Mantener en boca la pieza dentaria o raíz y disminuir la mortalidad dental
<b>4. ALCANCE:</b>	Inicia con la solicitud de la consulta odontológica y termina con la atención por el odontólogo tratante y fin del tratamiento prescrito.
<b>5. MARCO NORMATIVO:</b>	Guía propuesta por Salud Dental Para Todos para el Programa Nacional de Garantía de Calidad para la Atención Médica. (2007). Od. Marcelo A. Iruretagoyena. Od. Maria del Rosario Maríncola. Od. Jorge Markiewicz. Guía odontológica UIS Guía odontológica Universidad Nacional de Colombia

**6. CONTENIDO:**

No.	Descripción de la Actividad	Cargo Responsable	Punto de Control
1	Diligenciamiento historia clínica Llene la historia clínica de acuerdo con las normas pre-establecidas.	Odontólogos	Registro Historia Clínica
2	Preparación ambiente de trabajo Supervise la preparación del ambiente, equipo e instrumental. Recepcione y prepare al paciente, colóquele el babero desechable.	Auxiliar de odontología	Registro Historia Clínica
3	Lavar las manos según protocolo	Odontólogos	Registro Historia Clínica
4	Equipo de protección personal Colóquese equipo de protección personal: tapabocas, bata, mascarilla y guantes (operador y asistente).	Odontólogos	Registro Historia Clínica
5	Etiología	Odontólogos	Registro



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano  
Atención: "Pulpitis Reversible"

Código: PA-GU-7-PT-41

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 2 de 4

	Caries. Iatrogenia. Trauma		Historia Clínica
6	Manifestaciones clínicas Dolor intenso al frío y leve al calor, dulces y ácidos, desapareciendo al retirar la causa.	Odontólogos	Registro Historia Clínica
7	Examen clínico Pruebas positivas de vitalidad al frío. Pérdida de tejidos dentinarios. Dentina reblandecida. Posiblemente exposición pulpar. Operatoria defectuosa.	Odontólogos	Registro Historia Clínica
8	Examen radiográfico En radiografía periapical se observa destrucción del esmalte y dentina y posiblemente solución de continuidad en el techo de la cámara pulpar.	Odontólogos	Registro Historia Clínica
9	Tratamiento Anestesia (ver manual) Remoción de causa irritativa y tejido infectado. Recubrimiento pulpar indirecto con hidróxido de calcio en pasta. Obturación en ionómero de vidrio ketak molar. Alivio de oclusión en restauraciones.	Odontólogos	Registro Historia Clínica
10	Tratamiento farmacológico Nimesulide tabletas 100 mg VO c/12 horas. Acetaminofen, tabletas 400mg VO, cada 8 horas. Ibuprofeno, tabletas 400mg VO, cada 8 horas. En dientes vitales (pulpitis irreversible), no están indicados los antibióticos.	Odontólogos	Registro Historia Clínica
11	Evaluación del tratamiento Si el paciente no presenta sintomatología se debe hacer obturación definitiva después de noventa días, si hubo exposición pulpar se procede a criterio del profesional para remisión a endodoncia.	Odontólogos	Registro Historia Clínica
12	Registros finales Diligenciar historia clínica y registro estadístico	Odontólogos	Registro Historia Clínica
13	CIE-10 - KO4.0: Pulpitiis	Odontólogos	Registro Historia Clínica



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano  
Atención: "Pulpitis Reversible"

Código: PA-GU-7-PT-41

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 3 de 4

<b>7. FORMATOS:</b>	Historia clínica sistematizada Registro Diario De Actividades
<b>8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:</b>	<b>Pulpitis Reversible:</b> Es una enfermedad inflamatoria suave o moderada caracterizada por presentar vaso dilatación en una parte localizada de la pulpa causada por diversos estímulos en la cual la pulpa es capaz de regresar al estado no inflamatorio después de haber retirado el estímulo. También se conoce como hiperemia pulpar. Epidemiología: Aproximadamente el 90% de los pacientes requieren tratamiento para el dolor dental porque presentan problemas pulpares o periapicales. Signos y síntomas: Es característico un dolor agudo que permanece un momento más frecuente con alimentos o bebidas frías que con calientes y aire frío. No es espontáneo y no continua cuando se retira la causa. La diferencia clínica con la pulpitis no reversible es cuantitativa, dolor agudo de segundos de duración y desaparece al retirar el estímulo. Frío, dulce o amargo causa dolor, el cual puede volverse crónico. Reacciona normalmente a percusión, palpación, movilidad los tejidos periapicales son normales al examen radiográfico.

**9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:**

FECHA	VERSIÓN: No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
17-12-2014	0	PA-GU-7-PT-41	Elaboración protocolo

<b>10. ANEXOS:</b>	N. / A.
--------------------	---------

COPIA NO ORIGINAL



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano  
Atención: "Pulпитis Reversible"

Código: PA-GU-7-PT-41

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 4 de 4

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Funcionario Responsable	Responsable Subproceso
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 07-08-2014	Fecha: 08-08-2014
REVISION	APROBACION
Responsable Proceso	
Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar	Rector
Fecha: 11-08-2014	Fecha: 17-12-2014

**Nota:** La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.